

# Syndrome de fatigue post-fièvre Q

## Possible même en cas d'évolution bénigne

Après une infection aiguë par la fièvre Q, des symptômes cliniques ainsi qu'une altération de la qualité de vie persistent dans jusqu'à 40 % des cas et peuvent durer de 12 à 24 mois.

Symptômes les plus fréquents:

- Sensation de fatigue
- Limitations dans la vie quotidienne
- Troubles de la concentration
- Douleurs musculaires
- Sueurs nocturnes
- Le niveau de performance et de travail d'avant la maladie n'est souvent pas retrouvé au bout d'un an.

Le syndrome de fatigue post-fièvre Q représente un défi thérapeutique, car l'administration d'antibiotiques ne permet pas d'influencer la maladie. C'est pourquoi des approches thérapeutiques psychosomatiques et comportementales sont recommandées.

# Informations supplémentaires Q-GAPS

Q-Fever GermAn Interdisciplinary Program for ReSearch

Programme de recherche de la fièvre Q allemand, interdisciplinaire

Page d'accueil: [www.q-gaps.de/en](http://www.q-gaps.de/en)

E-Mail: [info@q-gaps.de](mailto:info@q-gaps.de)



## À qui s'adresser?

Dr Nestor D. NOUDEKE | Epidemiologist  
Eng, DVM, M.Sc, Ph.D  
Resident Advisor BENIN  
FETP Front line and Intermediate  
African Field Epidemiology Network  
US Centers for Disease Control and Prevention  
☎: +229 97 88 90 30

Créé par: Département de la santé  
du Land de Bade-Wurtemberg &  
Institut de Microbiologie de l'armée  
allemande, Munich

Mise à jour: Mars 2023

Ce dépliant a été financé par le Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche sous le numéro de projet 01KI1726A-G en tant que partie du Réseau national de recherche sur les maladies infectieuses zoonotiques.

# La Fièvre Q

Plus qu'un état grippal



©Pixabay, VanessaWN

Informations destinées à la  
population sur la fièvre Q  
chez les êtres humains

Après une infection aiguë  
par la fièvre Q, toujours  
penser à la possibilité d'un  
syndrome de fatigue post-fièvre Q.



SPONSORISÉ PAR LE



Ministère fédéral  
de l'Éducation  
et de la Recherche

## Qu'est-ce que la fièvre Q?

La fièvre Q est une maladie des êtres humains et des animaux (soit disant zoonose) causée par la bactérie *Coxiella (C.) burnetii*.

La transmission de l'agent pathogène des animaux à l'homme se fait principalement par des moutons et des chèvres. Les bovins, les chats, et les autres espèces animales sont moins souvent à l'origine d'infections par la fièvre Q chez l'homme.

Les animaux infectés excrètent *C. burnetii* en grande quantité, surtout pendant la mise bas ou un avortement. Malgré l'excrétion de la bactérie, les moutons et les chèvres ne présentent pas toujours de signes d'infection.

Les humains peuvent très facilement s'infecter en inhalant des particules de poussière contenant la bactérie. *C. burnetii* se propage par le vent, c'est pourquoi un contact direct avec un animal infecté n'est pas forcément nécessaire pour la transmission.



©Maik Konrad

**Les personnes peuvent facilement s'infecter en respirant des poussières contenant des agents pathogènes.**

## Fièvre Q aiguë

1 à 3 semaines après l'infection, environ 40 % des personnes infectées ont des problèmes de santé, tandis que chez les 60 % restants, l'infection est asymptomatique.

Les symptômes suivants peuvent apparaître:

Souvent des symptômes pseudo-grippaux tels que:

- Fièvre
- Douleurs musculaires
- Frissons
- Maux de tête sévères (derrière les yeux)

Plus rarement:

- Pneumonie
- Inflammation du foie

**La fièvre Q aiguë souvent ne se manifeste que peu, voire pas de symptômes. Se laisse bien traiter par des antibiotiques. Tenir compte des groupes à risque et la possibilité d'une évolution chronique.**

Si vous ou un membre de votre famille présentez les symptômes susmentionnés, consultez votre médecin.

Un test de dépistage de la fièvre Q peut être effectué à l'aide d'une prise de sang.

En cas de détection de la fièvre Q, la maladie peut être traitée de manière ciblée à l'aide d'antibiotiques.

## La fièvre Q chronique

Dans environ 1% des cas une infection par *C. burnetii* peut entraîner 6 mois à 10 ans plus tard une fièvre Q chronique.

Cette maladie chronique doit généralement être traitée par des antibiotiques pendant plusieurs années et présente un taux de mortalité élevé en l'absence de traitement.

Les signes typiques sont:

Fréquent:

- Des inflammations de la membrane cardiaque

Rare:

- Inflammation du foie

## Groupes à risque

Les personnes qui sont en contact avec des moutons, des chèvres ou des bovins ou des matériaux provenant de ces animaux dans le cadre de leur travail présentent un risque accru d'infection à *C. burnetii*.

Les femmes enceintes peuvent également être exposées à un risque accru d'avortement et d'accouchement prématuré, ainsi qu'à un faible poids à la naissance, en cas d'infection aiguë ou de fièvre Q chronique. Une transmission de la mère à l'enfant à naître dans l'utérus avec des conséquences tardives pour l'enfant n'a pas été décrite jusqu'à présent.

Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou d'une immunosuppression sévère (suppression des défenses naturelles de l'organisme) présentent un risque fortement accru de passage à une infection chronique.

**Reconnaître et traiter la fièvre Q à un stade précoce afin d'éviter les séquelles.**